

Hinweise zur Aufbewahrung von Takhzyro®



Um Ihr Medikament sicher aufzubewahren, sollten Sie unbedingt folgende Hinweise beachten:

- + Bewahren Sie Takhzyro bei 2 °C bis 8 °C im Kühlschrank auf, frieren Sie es **nicht** ein.
- + Belassen Sie Takhzyro in dem **Umkarton**, um das Medikament vor Licht zu schützen.
- + **Nehmen Sie die Takhzyro-Fertigspritze 15 Minuten bzw. den Takhzyro-Fertigpen 30 Minuten vor der Anwendung aus dem Kühlschrank**, damit das Medikament Raumtemperatur erreichen kann und schütteln Sie es nicht.
- + Verwenden Sie Takhzyro **innerhalb von 14 Tagen** nach der Entnahme aus dem Kühlschrank. Bitte beachten Sie, dass das Medikament innerhalb dieser Zeit unterhalb von 25 °C aufbewahrt werden muss. Legen Sie Takhzyro nach der Aufbewahrung bei Raumtemperatur nicht wieder in den Kühlschrank.
- + Bewahren Sie Takhzyro außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Nur im Rahmen einer Takhzyro-Verordnung zur Abgabe an Patient:innen

Ihnen wurde zur Behandlung des Hereditären Angioödems Takhzyro verschrieben. Verwenden Sie Takhzyro erst, nachdem Ihnen die Anwendung von Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin oder dem medizinischen Fachpersonal gezeigt worden ist und lesen Sie bitte vor Gebrauch die Packungsbeilage, dort finden Sie auch Informationen zur Art der Anwendung und zur Sicherheit des Arzneimittels. Falls Sie irgendwann Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt / Ihre Ärztin, Ihre Apotheke oder das medizinische Fachpersonal. Sie können sich auch gerne jederzeit an Takeda wenden, die Kontaktdaten finden Sie am Ende des Abschnitts 6 der Packungsbeilage oder Sie wenden sich per E-Mail an: medinfoEMEA@takeda.com. Die bereitgestellten Informationen stellen keinen Ersatz für eine medizinische Beratung dar.

Folgen Sie #Lebenmithae auf



Weitere Informationen zur
Erkrankung sowie zu Services
für Betroffene und Interessierte
leben-mit-hae.de



Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG
Potsdamer Str. 125 • 10783 Berlin
www.takeda.de

Takhzyro ist eine eingetragene Marke der Dyax Corp.

Takeda und  sind eingetragene Marken der Takeda Pharmaceutical Company Limited.

C-ANPROM/DE/TAKH/0009_TPS3042_05.2025